UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN – LA VICTORIA, 2020

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORES:

Bachiller. Oroña Leonardo, Lizeth Luz

Bachiller. Corcuera Rodríguez, Shirley Madeleine

ASESOR:

Dr. Mamani Mendivil, Mauricio Gregorio

LIMA - PERÚ

2021

DEDICATORIA

A Dios de antemano, por todas las bendiciones materiales, espirituales y profesionales que me ha dado hasta ahora para seguir adelante con mis proyectos y metas. A mis padres por ser los mejores padres del mundo, por apoyarme siempre y estar cuando más los necesitaba, y por ser mi guía y fortaleza.

Oroña Leonardo, Lizeth Luz

En primer lugar a Dios, por brindarme fortaleza y guiarme en el camino. A mis Padres que a pesar de la distancia siempre estuvieron brindándome su apoyo incondicional para alcanzar mis metas y sueños. A mi abuelo que me apoyo en este gran proceso para culminar mi carrera profesional. A mi familia que siempre estuvieron alentándome y apoyándome para seguir adelante.

Corcuera Rodríguez, Shirley Madeleine

RESUMEN

La siguiente investigación tuvo el **objetivo** de identificar la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica en el Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - La Victoria, 2020. Empleando la **metodología**: estudio de corte transversal, de diseño descriptivo no experimental, de enfoque cuantitativo. Se consideró una muestra conformada por 40 pacientes que presentan deficiencias renales crónicas quienes son dializados en el referido centro hospitalario. **Resultados:** las edades del 50% de los pacientes fluctuaban entre 43 a 49 años; el 55% eran mujeres; el 45% de los pacientes eran casados, el 37.5% tenía grado de instrucción secundaria. Asimismo, se pudo determinar que el 50% de los pacientes recibían el servicio de hemodiálisis y el 70% lo realizaba al menos 4 semanas. Sobre calidad de vida, el mayor porcentaje aprecia que la calidad de vida es media con 47.5%, seguido de calidad baja con 37.5% y calidad alta con 15%. Con respecto a sus dimensiones el mayor porcentaje (92.5%) presenta calidad de vida media en la dimensión vitalidad, seguido de salud mental con 77.5%, función social 70%, salud general 60%, dolor corporal 55% y función física 50%; presenta calidad de vida baja en rol emocional con 57.5% y rol físico con 55%. **Conclusiones**: se determinó que los pacientes con deficiencias renales crónica presentan un nivel medio respecto de la calidad de vida. Asimismo, se pudo evidenciar que los pacientes presentan ese mismo nivel en las siguientes dimensiones vitalidad, salud mental, función social, salud general, dolor corporal y función física; pero calidad de vida baja en rol emocional y rol físico.

Palabras claves: Calidad de vida, insuficiencia renal, nefrología.

ABSTRACT

The following research work was developed with the objective of identifying the quality of life in patients with chronic renal failure in the Nephrology Service of the Guillermo Almenara Irigoyen National Hospital - La Victoria, 2020. Using the methodology: cross-sectional study, descriptive design non-experimental, quantitative approach. A sample consisting of 40 patients with chronic renal failure from the dialysis service of the referred hospital was considered. Results: the majority of patients were aged between 43 to 49 years with 50%; 55% female, 45% married, with a secondary education level 37.5%, 50% with hemodialysis treatment and 70% treatment with less than 4 weeks. Regarding quality of life, the highest percentage appreciates that the quality of life is medium with 47.5%, followed by low quality with 37.5% and high quality with 15%. Regarding its dimensions, the highest percentage (92.5%) presents average quality of life in the vitality dimension, followed by mental health with 77.5%, social function 70%, general health 60%, body pain 55% and physical function 50%; presents low quality of life in emotional role with 57.5% and physical role with 55%. Conclusions: it was determined that the quality of life is average in patients with chronic renal failure. Likewise, there is an average quality of life in the dimensions of vitality, mental health, social function, general health, bodily pain and physical function; but low quality of life in emotional role and physical role.

Keywords: Quality of life, renal failure, nephrology.