UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN DEL USO DEL IMPLANTE HORMONAL EN USUARIAS ATENDIDAS EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL JOSÉ GÁLVEZ – VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, 2021

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA

AUTORES:

Bachiller. Amañe Pardo Margiory Yajaira

Bachiller. Guivin Herrera Yahaira del Pilar

ASESOR:

Dr. Olivares Taipe Paulo Cesar

LIMA – PERÚ

2022

DEDICATORIA

Ante todo, quisiera agradecer a dios a mis padres y a todos aquellos cercanos a mí que me dijeron que, si puedo, ellos fueron mi apoyo y mi hombro en todo estos más de 5 largos años, por un momento retrocedí, pero estuvieron ahí para apoyarme, y hoy ante ellos estoy a tan solo pasos de poder lograr todos mis objetivos…y ser una profesional…prometo dar todo lo mejor de mí, muchas gracias por todo. ¡¡¡ Los adoro¡¡¡

.

Yahaira del Pilar.

DEDICATORIA

Dedico con todo mi corazón mi tesis a mis padres y abuela pues sin ellos no lo habría logrado, gracias a su apoyo y consejos.

A mis hermanos y tíos por sus palabras y su compañía.

Finalizar dedico a mi hija Ainhoa porque fue mi mayor motivo para continuar con este largo camino.

.

Margiory Yajaira.

RESUMEN

Objetivo. Determinar los factores asociados a la deserción del uso del implante hormonal en usuarias atendidas en el Centro Materno Infantil José Gálvez – Villa María del Triunfo, 2021. **Tipo y diseño.** Es básico, observacional, de enfoque cuantitativo y transversal. **Población.** El total de usuarias de implante anticonceptivo hormonal que hayan iniciado el uso del método dentro de los últimos tres años. **Resultados.** En los factores estudiados, se acepta que la edad de 20 a 35 años con una probabilidad de 5 veces la ocurrencia, el deseo de tener un embarazo con una probabilidad de 5 veces la ocurrencia, cefalea con una probabilidad de 5 veces la ocurrencia; aumento de peso con una probabilidad de 6 veces la ocurrencia; alteraciones en el estado de ánimo con una probabilidad de 5 veces la ocurrencia; dolor pélvico con una probabilidad de 5 veces la ocurrencia; dolor mamario con una probabilidad de 4 veces la ocurrencia. Se concluye que existen factores sociodemográficos, obstétricos y efectos secundarios asociados al abandono del uso del implante hormonal.

Palabras Clave: abandono, implante, usuarias y factores.

ABSTRACT

Objective. To determine the factors associated with the abandonment of the use of the hormonal implant in users treated at the José Gálvez Maternal and Child Center - Villa María del Triunfo, 2021. Type and design. It is basic, observational, with a quantitative and transversal approach. Population. The total number of hormonal contraceptive implant users who have started using the method within the last three years. Results. In the factors studied, it is accepted that the age of 20 to 35 years with a probability of 5 times the occurrence, the desire to have a pregnancy with a probability of 5 times the occurrence, headache with a probability of 5 times the occurrence; weight gain with a probability of 6 times the occurrence; mood disturbances with a 5-fold probability of occurrence; pelvic pain with a probability of 5 times the occurrence; breast pain with a probability of 4 times the occurrence. It is concluded that there are sociodemographic, obstetric factors and secondary effects associated with the abandonment of the use of the hormonal implant.

Keywords: abandonment, implant, users and factors.