UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL TRIMESTRAL EN USUARIAS DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL-JOSE GÁLVEZ, 2020

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA

AUTOR (ES):

Bachiller. Solís Verastegui Sofía Nilda

Bachiller. Mendoza Ccente Dennys Jhocevet

ASESOR:

Dr. Jose Luis Aguilar Saenz

LIMA – PERÚ

2020

DEDICATORIA

A lo más preciado en la vida, a Dios y en la tierra a mis padres, porque juntos me han guiado con amor, paciencia y sabiduría.

Sofía Nilda.

DEDICATORIA

A Dios y a mi familia por ayudarme a consentir el logro de las metas propuestas, agradeciéndoles su inmenso amor, cariño y fortaleza espiritual.

Dennys Jhocevet.

RESUMEN

Objetivo. Determinar cuáles son los factores asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal trimestral en usuarias del área de Planificación Familiar en el Centro Materno Infantil-Jose Gálvez, 2020. **Tipo y diseño.** Es básico, observacional, cuantitativo, prospectivo y transversal. **Población.** Fueron usuarias atendidas en los meses de junio, julio y agosto del área de Planificación Familiar en el Centro Materno Infantil-Jose Gálvez, 2020. **Resultados.** Los factores sociodemográficos asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal trimestral fueron edad (x2= 4.42, p=0.039), el estado civil (x2=5.28, p=0.028) y nivel educativo (x2= 5.41, p=0.025). Los factores personales asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal trimestral fueron olvido de la administración (x2= 5.23, p=0.022), inseguridad del método (x2=6.07, p=0.016) y tiene desconfianza del método (x2= 5.38, p=0.019). Los efectos adversos asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal trimestral fueron sangrado uterino anormal (X2= 5.896, p=0.014), incremento del peso (X2=5,995, p=0,012), cefalea (X2=4,107, p=0,038). Los factores clínicos asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal trimestral fueron dejo y/o(aría) por descanso hormonal del organismo (X2= 4,359, p=0.042). **Conclusión.** existen factores asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal trimestral en usuarias del área de Planificación Familiar en el Centro Materno Infantil-Jose Gálvez.

Palabras Clave: anticonceptivo hormonal, usuarias.

ABSTRACT

Objective. Determine what are the factors associated with abandonment of the quarterly hormonal contraceptive method in users of the Family Planning area at the Centro Materno Infantil-Jose Gálvez, 2020. Type and design. It is basic, observational, quantitative, prospective and transversal. Population. Users were attended in the months of June, July and August of the Family Planning area at the Centro Materno Infantil-Jose Gálvez, 2020. Results. The sociodemographic factors associated with abandoning the quarterly hormonal contraceptive method were age (x2 = 4.42, p = 0.039), marital status (x2 = 5.28, p = 0.028) and educational level (x2 = 5.41, p = 0.025). The personal factors associated with abandoning the quarterly hormonal contraceptive method were forgetfulness of the administration (x2 = 5.23, p = 0.022), insecurity of the method (x2 = 6.07, p = 0.016) and mistrust of the method (x2 = 5.38, p = 0.019). The adverse effects associated with abandoning the quarterly hormonal contraceptive method were abnormal uterine bleeding (X2 = 5.896, p = 0.014), weight gain (X2 = 5.995, p = 0.012), headache (X2 = 4.107, p = 0.038). The clinical factors associated with the abandonment of the quarterly hormonal contraceptive method were withdrawal and / or (aría) due to hormonal rest of the organism (X2 = 4.359, p = 0.042). Conclusion. There are factors associated with the abandonment of the quarterly hormonal contraceptive method in users of the Family Planning area at the Centro Materno Infantil-Jose Gálvez.

Key Words: hormonal contraceptive, users.