UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ITS Y NIVEL DE RIESGO SOBRE CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN ADOLESCENTES DE LA I.E. JOSÉ OLAYA BALANDRA N.º 6090

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA

AUTORA

Bach. Marely Angelica Gutierrez Huayanca

ASESOR

Dr. Allyn Oswaldo Zavaleta Pesantes

LIMA - PERÚ

2023

DEDICATORIA

A mis queridos padres, a mi amado esposo y a mi adorado hijo André que me motivan a seguir avanzando para lograr mis metas.

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre el NC-ITS y el NR-CSR en adolescentes de I.E. José Olaya Balandra N.º 6090, Lima 2023. **Método:** Analítico-correlacional. Con una muestra de 237 adolescentes, obtenida mediante la fórmula de tamaño de muestra para población finita con un porcentaje de error del 5%. Los datos fueron recolectados con dos instrumentos con evidencias de validez y confiabilidad: Cuestionario de NC-ITS y Escala de NR-CSR. Se utilizaron pruebas no paramétricas para el análisis comparativo y de correlación de las variables. **Resultados:** más del 55% de los adolescentes tienen un nivel intermedio de NC-ITS y la mayoría reportó un nivel de riesgo bajo sobre NR-CSR. Se encontraron diferencias significativas en las puntuaciones de las variables según género y edad, y se observó una correlación inversamente proporcional entre las variables NC-ITS y NR-CSR en adolescentes, lo cual indica una relación significativa. **Conclusiones:** Implementar programas de educación y prevención específicos para adolescentes escolares, considerando el género y la edad, para mejorar la comprensión y conciencia sobre las ITS y disminuir el NR-CSR.

Palabras clave (DeCS – BIREME): Conocimiento, Infección de transmisión sexual, Conductas sexuales de riesgo, adolescente, Salud sexual y reproductiva

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between NC-ITS and NR-CSR in adolescents of I.E. José Olaya Balandra No. 6090, Lima 2023. **Method:** Quantitative and analytical correlational. The sample was 237 adolescents, obtained using the sample size formula for finite population with an error percentage of 5%. Data were collected with two instruments with evidence of validity and reliability: NC-ITS Questionnaire and NR-CSR Scale. Non-parametric tests were used for comparative and correlation analysis of the variables. **Results:** more than 55% of adolescents have an intermediate level of NC-ITS and most reported a low level of risk on NR-CSR. Significant differences were found in the scores of the variables according to gender and age, and an inversely proportional correlation was observed between the variables NC-ITS and NR-CSR in adolescents, indicating a significant relationship**. Conclusions:** to implement specific education and prevention programs for school adolescents, considering gender and age, to improve understanding and awareness of STIs and decrease NR-CSR.

Key words (DeCS - BIREME): Knowledge, Sexually transmitted infection, Sexual risk behaviors, adolescent, Sexual and reproductive health.