UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN NIÑOS DE 6 A 12 MESES DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD SAN CARLOS EN SANTA ANITA Y CARLOS PRÓTZEL EN COMAS

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTOR:

Bachiller: Serna Flores, Madeline

ASESOR:

Mg. Huamani Alhuay, Edward

LIMA – PERÚ

2016

RESUMEN

Objetivo: Determinar la diferencia del nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria en niños de 6 a12 meses de las madres que acuden a los Centros de Salud San Carlos en Santa Anita y Carlos Prótzel en Comas. **Tipo y diseño de estudio**: Investigación cuantitativa comparativa y diseño transversal. La muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple conformado por un total de 100 madres de familias. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario, la técnica fue la entrevista. Con la información obtenida se realizó un control de calidad, luego se ingresó a una base de datos en el programa Microsoft office Excel 2010, los resultados fueron analizados con el programa SPSS, con el cual se obtuvo frecuencia y porcentajes. **Resultados:** Al comparar ambos Centros de Salud, en el Centro de Salud Carlos Prótzel en Comas el nivel de conocimiento fue alto, con 55.6% (n=30), con la diferencia en el Centro de Salud San Carlos en Santa Anita el nivel de conocimiento fue medio, con 82.6% (n=38), también se observó que en el Centro de Salud Carlos Prótzel el nivel de conocimiento fue bajo, con 0.0% (n=0), con la diferencia en el Centro de Salud San Carlos el nivel de conocimiento fue bajo, con 10.9% (n=5). Al comparar la primera dimensión del nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria relacionado a la edad de 6 a 8 meses, se observó la diferencia, en el Centro de Salud Carlos Prótzel el nivel de conocimiento fue alto, con 75.9% (n=41), con la diferencia que en el Centro de Salud San Carlos el nivel de conocimiento fue medio, con 65.2% (n=30), en la segunda dimensión relacionado a la edad de 9 a 11 meses en el Centro de Salud Carlos Prótzel el nivel de conocimiento fue alto, con 66.7% (n=36), con la diferencia en el Centro de Salud San Carlos el nivel de conocimiento fue medio, con 60.9% (n=28), y en la tercera dimensión relacionado a la edad de 12 meses, el nivel de conocimiento en el Centro de Salud Carlos Prótzel fue alto, con 64.8% (n=35), con la diferencia en el Centro de Salud San Carlos el nivel de conocimiento fue medio, con 50.0% (n=23). **Conclusiones:** Existen

diferencias significativas entre el Centro de Salud San Carlos en Santa Anita y en el Centro de Salud Carlos Prótzel en Comas.

Palabras claves: nivel de conocimiento, madres, Alimentación complementaria.

ABSTRACT

Objective: To determine the difference in the level of knowledge about complementary feeding in children aged 6 to 12 months of the mothers who attend the San Carlos Health Centers in Santa Anita and Carlos Prótzel in Comas. Type and study design: Quantitative comparative research and cross-sectional design. The sample was obtained by simple random sampling made up of a total of 100 mothers of families. The instrument that was used was a questionnaire, the technique was the interview. With the information obtained, a quality control was performed, then entered into a database in the program Microsoft office Excel 2010, the results were analyzed with the SPSS program, with which frequency and percentages were obtained. Results: When comparing both Health Centers, at the Carlos Prótzel Health Center in Comas the level of knowledge was high, with 55.6% (n = 30), with the difference in the San Carlos Health Center in Santa Anita the level of Knowledge was average, with 82.6% (n = 38), it was also observed that the level of knowledge in the Carlos Prótzel Health Center was low, with 0.0% (n = 0), with the difference in the San Carlos Health Center The level of knowledge was low, with 10.9% (n = 5). When comparing the first dimension of the level of knowledge about complementary feeding related to the age of 6 to 8 months, the difference was observed, at the Carlos Prótzel Health Center the level of knowledge was high, with 75.9% (n = 41), With the difference that in the San Carlos Health Center the level of knowledge was medium, with 65.2% (n = 30), in the second dimension related to the age of 9 to 11 months in the Carlos Prótzel Health Center the level of Knowledge was high, with 66.7% (n = 36), with the difference in the San Carlos Health Center the level of knowledge was medium, with 60.9% (n = 28), and in the third dimension related to the age of 12 , The level of knowledge in the Carlos Health Center was high, with 64.8% (n = 35), with the difference in the San Carlos Health Center the level of knowledge was medium, with 50.0% (n = 23) . Conclusions: There are significant differences between the San Carlos Health Center in Santa Anita and the Carlos Prótzel Health Center in Comas.

Key words: level of knowledge, mothers, complementary feeding.