UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS DE 0 A 6 MESES DE EDAD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO MIRAFLORES II DE JOSÉ GÁLVEZ - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, 2021

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORES:

Bachiller. Basurto Hilario, Lourdes Jaqueline

Bachiller. Carhuaricra León, Madeleine Melissa

ASESOR:

Mg. Flores Laiza, Luzmelda

LIMA – PERÚ

2021

DEDICATORIA

Principalmente a Dios, por ser el inspirador y darme la fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados. A mis padres por todo su amor, comprensión y apoyo, pero sobre todo gracias infinitas por la paciencia que me han tenido. No tengo palabras para agradecerles las incontables veces que me brindaron su apoyo en todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida.

Basurto Hilario, Lourdes Jaqueline

A Dios, por ser mi guía y fortaleza. A mis Padres, quienes estuvieron siempre apoyándome para alcanzar mis objetivos, brindándome cariño sincero e incondicional; gracias a ellos que hicieron posible la culminación de mi carrera profesional y por estar en las buenas y en las malas en este largo camino.

Carhuaricra León, Madeleine Melissa

RESUMEN

El siguiente trabajo investigativo se desarrolló con el **objetivo** de establecer la relación entre la lactancia materna y desarrollo psicomotor de niños de 0 a 6 meses de edad en el Asentamiento Humano Alto Miraflores II de José Gálvez - Villa María del Triunfo, 2021. Empleando la **metodología**: estudio de corte transversal, de diseño correlacional descriptivo no experimental, de enfoque cuantitativo. Se consideró una población total de 80 madres de infantes de 0 a 6 meses de edad. **Resultados:** el 41.3% de las madres tenían edades de 26 a 35 años, 38.8% tenían instrucción secundaria, 68.8% eran convivientes, 47.5% eran amas de casa; con respecto a los niños, según edades 30% tenían 2 meses de edad, seguido del 20% con 4 meses de edad; el 52.5% eran de sexo femenino y 47.5% masculino. Según lactancia materna, el mayor porcentaje de madres encuestadas practicaba lactancia materna mixta con 47.5%, seguido de lactancia materna exclusiva con 31.3% y en menor porcentaje lactancia materna artificial con 21.3%. Con respecto al desarrollo psicomotor, el 18.8% de niños evaluados están en retraso, 53.8% están en riesgo y 27.5% normal. Con respecto a sus dimensiones el mayor porcentaje, es decir el 63.8% presenta desarrollo psicomotor en riesgo en la dimensión social, seguido de la dimensión lenguaje con 56.3%, la dimensión motora con 48.8% y la dimensión de coordinación con 47.5%. **Conclusión**: se determinó la existencia de alta relación significativa entre el tipo de lactancia materna y el desarrollo psicomotor de niños de 0 a 6 meses en el Asentamiento Humano Alto Miraflores II de José Gálvez - Villa María del Triunfo; es decir que, si se practica una lactancia materna exclusiva, el desarrollo psicomotor será normal.

Palabras claves: Lactancia materna, desarrollo psicomotor, madres.

ABSTRACT

The following research work was developed with the objective of establishing the relationship between breastfeeding and psychomotor development of children from 0 to 6 months of age in the Alto Miraflores II Human Settlement of José Gálvez - Villa María del Triunfo, 2021. Using the methodology: a cross-sectional study, with a non-experimental descriptive correlational design, with a quantitative approach. A total population of 80 mothers of infants from 0 to 6 months of age was considered. Results: 41.3% of the mothers were between 26 and 35 years old, 38.8% had secondary education, 68.8% were partners, 47.5% were housewives; Regarding children, according to age, 30% were 2 months old, followed by 20% 4 months old; 52.5% were female and 47.5% male. According to breastfeeding, the highest percentage of surveyed mothers practiced mixed breastfeeding with 47.5%, followed by exclusive breastfeeding with 31.3% and, to a lesser extent, artificial breastfeeding with 21.3%. Regarding psychomotor development, 18.8% of evaluated children are in delay, 53.8% are at risk and 27.5% are normal. Regarding its dimensions, the highest percentage, that is, 63.8% presents psychomotor development at risk in the social dimension, followed by the language dimension with 56.3%, the motor dimension with 48.8% and the coordination dimension with 47.5%. Conclusion: the existence of a high significant relationship between the type of breastfeeding and the psychomotor development of children from 0 to 6 months was determined in the Alto Miraflores II Human Settlement of José Gálvez - Villa María del Triunfo; In other words, if exclusive breastfeeding is practiced, psychomotor development will be normal.

Keywords: Breastfeeding, psychomotor development, mothers.