UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

FACTORES RELACIONADOS A LA INFECCIÓN POR EL VIRUS PAPILOMA HUMANO EN MUJERES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES – COMAS, 2018

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORA:

Bachiller. Loli Castro, Katty Marlene

ASESOR:

Mg. Huamani Alhuay, Edward Filomeno

LIMA – PERÚ

2018

RESUMEN

La presente investigación tuvo como **objetivo** determinar los factores relacionados a la infección por el virus papiloma humano en mujeres que acuden al Servicio de Ginecología del Hospital Nacional Sergio E. Bernales – Comas, 2018. **Metodología**: el tipo de estudio fue epidemiológico analítico, observacional con enfoque cuantitativo y el diseño no experimental con un sentido retrospectivo de caso y control. La muestra de estudio fue de 180 pacientes mujeres divididos en 90 casos con diagnóstico de VPH y 90 controles sin VPH. El instrumento de medición fue un cuestionario sobre factores relacionados al VPH; la información recolectada fue procesada con el IBM SPSS versión 23. Los factores más relacionados se identificaron mediante la prueba Chi cuadrado. **Resultados:** este estudio consideró edades comprendidas entre los 18 a más de 40 años; teniendo en cuenta la mayoría de casos, dentro de los factores demográficos, 38.9% tenían edades entre 30 a 39 años, estando en convivencia el 54.4%, con trabajo independiente el 50% y con instrucción secundaria 60%. En relación a factores sociales, el 63.3% a veces consumía bebidas alcohólicas y 43.3% a veces fumaba. Con respecto a la prevalencia de factores ginecológicos, el 55.6% presentaron menarquia con 9 a 12 años de edad, 54.4% tuvieron su primera relación sexual entre los 18 a 20 años, 46.7% tuvieron de dos a tres parejas sexuales, 50% dijeron que su pareja actual no tiene más parejas sexuales, 62.2% que a veces su pareja usa condón, 51.1% por primera vez fueron diagnosticadas de VPH con más de 20 años, 53.3% a veces ha sufrido flujo vaginal, 73.3% a veces ha sufrido descenso y 36.7% a veces uso anticonceptivos orales. **Conclusión**: los factores demográficos, sociales y ginecológicos considerados en este estudio están relacionados significativamente a la infección por el virus papiloma humano según contraste Chi cuadrado ($p<0.05$).

Palabras claves: factor de riesgo, infección, virus del papiloma humano.

ABSTRACT

The objective of the present investigation was to determine the factors related to human papillomavirus infection in women attending the Service of Gynecology of the National Hospital Sergio E. Bernales - Comas, 2018. Methodology: the type of study was epidemiological, analytical, observational with a quantitative approach and the non-experimental design with a retrospective sense of case and control. The study sample was 180 female patients divided into 90 cases with a diagnosis of HPV and 90 controls without HPV. The measuring instrument was a questionnaire about factors related to HPV; the information collected was processed with the IBM SPSS version 23. The most related factors were identified by the Chi square test. Results: this study considered ages between 18 to more than 40 years; taking into account the majority of cases, within the demographic factors, 38.9% had ages between 30 to 39 years, being in cohabitation 54.4%, with 50% independent work and 60% secondary education. In relation to social factors, 63.3% sometimes consumed alcoholic beverages and 43.3% sometimes smoked. With regard to the prevalence of gynecological factors, 55.6% had menarche with 9 to 12 years of age, 54.4% had their first sexual relationship between 18 to 20 years, 46.7% had two to three sexual partners, 50% said that your current partner has no more sexual partners, 62.2% sometimes use a condom, 51.1% were diagnosed for the first time with HPV over 20 years, 53.3% have had vaginal discharge, 73.3% have sometimes suffered a decrease and 36.7% sometimes use oral contraceptives. Conclusion: the demographic, social and gynecological factors considered in this study are significantly related to the human papilloma virus according to Chi square contrast ($p < 0.05$).

Keywords: risk factor, infection, human papilloma virus.