UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PREECLAMPSIA EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ EN EL PERIODO 2017

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADA DE OBSTETRICIA

AUTORAS:

Bachiller: Ignacio Arenas Jhoseling Yhomira

Bachiller: Ochante Garcia Nahomi Koralí Milagros

ASESOR

Mg: Huapaya Cabrera Alejandro Héctor

LIMA – PERÚ

2019

RESUMEN

Objetivo. Determinar los factores de riesgo asociados a preeclampsia en gestantes. **Tipo y diseño de estudio.** Investigación cuantitativa, observacional analítica, retrospectiva, no experimental caso control, la **muestra** estuvo constituida por 186 gestantes (93 casos y 93 controles) del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz atendidas en el 2017, aplicándose el **instrumento** (ficha de recolección de datos), con la finalidad de evaluar los factores de riesgo a preeclampsia. Se usó el programa de Microsoft Office Excel 2010 y el programa SPSS para su análisis. **Resultados.** Sociodemograficamente predominó el grupo etario entre 19 y 34 años, un grado secundaria, estado civil conviviente y la raza mestiza; el factor riesgo sociodemográfico de padecer preeclampsia es 2,5 (OR: 2,517, IC95%: 1,204 - 5,264) veces mayor en las gestantes del grupo etario de mayor de 35 años. En cuanto a los factores maternos que predominaron fueron la diabetes, la obesidad, la nuliparidad, la hipertensión arterial crónica, y los antecedentes familiares de preeclampsia; los factores de riesgo materno de padecer preeclampsia son: diabetes 2,2 (OR: 2,208, IC95%: 1,872 - 2,604); obesidad 4,8 (OR: 4,875, IC95%: 1,341- 17,728); hipertensión arterial crónica 2,6 (OR: 2,632, IC95%: 2,145 - 3,228)y antecedentes familiar de preeclampsia 19,6 (OR: 19,600, IC95%:8,690 - 44,208). **Conclusiones**. Los factores de riesgo de preeclampsia asociados significativamente son edad mayor de 35 años, diabetes, obesidad, hipertensión arterial crónica, antecedentes familiares de preeclampsia.

Palabras claves: Preeclampsia, factores de riesgo

ABSTRACT

Objective. Determine the risk factors associated with preeclampsia in pregnant women. **Type and study design**. Quantitative, observational, analytical, retrospective, non-experimental case control investigation, the **sample** consisted of 186 pregnant women (93 cases and 93 controls) of the Carlos Lanfranco La Hoz Hospital treated in 2017, applying the **instrument** (data collection sheet), with the purpose of assessing risk factors to preeclampsia. The Microsoft Office Excel 2010 program and the SPSS program were used for analysis. **Results** The age group prevailed socio-demographically between 19 and 34 years, a secondary degree, cohabiting marital status and the mixed race; the sociodemographic risk factor of suffering from preeclampsia is 2.5 (OR 2,517 95% CI: 1,204 - 5,264) times higher in pregnant women of the age group over 35 years. As for the maternal factors that predominated were diabetes, obesity, nulliparity, chronic arterial hypertension, and family history of preeclampsia; Maternal risk factors for preeclampsia are: diabetes 2.2 (OR 2,208 95% CI: 1,872-2,604); Obesity 4.8 (OR 4,875 95% CI: 1,341-17,728); Chronic arterial hypertension 2.6 (OR 2,632 95% CI: 2,145 - 3,228) and family history of preeclampsia 19.6 (OR 19,600 95% CI: 8,690 - 44,208). **Conclusions** The significantly associated risk factors for preeclampsia are age over 35 years, diabetes, obesity, chronic hypertension, family history of preeclampsia.

Keywords: Preeclampsia, risk factors